



Zgoda na USG transrektalne TRUS

USG transrektalne (przezodbytnicze, TRUS, AUS) to badanie, które bardzo dokładnie obrazuje nieprawidłowości w obrębie odbytu i odbytnicy celem dokładniejszej diagnostyki proktologicznej. Dzięki temu lekarz może dobrać najlepszą metodę leczenia, a także ocenić efekty swojej pracy po wykonaniu operacji w obrębie odbytu i odbytnicy.

Przygotowanie do badania

Należy zadbać o to, aby w dniu poprzedzającym badanie posiłki powinny być lekkostrawne, nie powodujące wzdęć. Przed zabiegiem zalecane jest wykonanie wlewki doodbytniczej. Na badanie nie trzeba zgłaszać się na czczo, jednak ok. 2-3 godziny przed jego wykonaniem należy się wstrzymać od jedzenia.

USG transrektalne (przezodbytnicze) - na czym polega?

Pacjent kładzie się na stole, na lewym boku z kolanami podciągniętymi do brzucha. Lekarz nakłada na sondę ultrasonografu (kształtem i wielkością zbliżoną do palca) osłonkę medyczną oraz żel i wprowadza ją odbytu na głębokość kilku centymetrów. Urządzenie przesyła obraz do monitora, na którym lekarz obserwuje przebieg badania. Pacjentowi nie jest podawane znieczulenie. Badanie trwa ok. pół godziny.

Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się ze szczegółowym opisem zabiegu, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku w/w leczenia
- zgadzam się na ewentualne zmodyfikowanie sposobu zabiegu w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeśli będzie tego wymagała sytuacja powstała w wyniku procesu terapeutycznego i na wiążące się z tym koszty
- stwierdzam, że uzyskałem/ -am wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania i wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu

podpis pacjenta